

A Terapia da Fala na pessoa com Doença de Parkinson

Vital, P.*; Coutinho, A.* (2008)

Comunicar é preciso...!

As alterações da comunicação e da deglutição na pessoa com Doença de Parkinson (DP) são responsáveis por limitações significativas na qualidade de vida do doente e da sua família, podendo afectar seriamente a vida social e emocional de ambos.

Alterações da Comunicação Verbal

Disartria Hipocinética

Disfonia (Hipofonia)

Alterações da Ressonância
(Hipernasalidade)

Disfluência

Disprosódia

Micrografia

Alterações da Comunicação Não-Verbal

Amimia (Facies em "Máscara")

Diminuição do piscar dos olhos (Olhar "parado")

Diminuição do uso do gesto

Postura Flexionada

Dificuldade no traço
(Desenho)



Disfagia na pessoa com DP

Sialorreia

Perda de saliva ou espessamento ("boca seca")

Dificuldades na mastigação

Engasgue, tosse, pigarreio

Aspiração



Problemas Associados:

- Diminuição do apetite
- Diminuição da sensibilidade do paladar e do olfacto

Intervenção do TF

Manter a competência e habilidade comunicativa o melhor possível por maior tempo possível.

Monitorizar quaisquer **problemas de mastigação / deglutição e fornecer orientação** quando necessário.

Promover o desenvolvimento e a prestação de cuidados dentro de programas de intervenção multidisciplinar / interdisciplinar.

Encorajar os Neurologistas para a referência precoce para TF da pessoa com DP de forma a maximizar os benefícios das abordagens terapêuticas disponíveis.